

**RAPPEL :** L'équation réduite de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $x_0$  est donnée par :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

Dans chaque cas, on considère une fonction  $f$  dérivable sur un intervalle  $I$  et un point  $x_0$ . On note  $C$  la courbe représentative de  $f$  dans un repère orthonormal  $(O, I, J)$ . On demande de déterminer :

- la valeur de  $f$  en  $x_0$  ;
- la fonction dérivée de  $f$  ;
- le nombre dérivé de  $f$  en  $x_0$  ;
- l'équation de la tangente.

**1.**  $f(x) = 2x^2 - 6x + 4$  , avec  $I = \mathbb{R}$  et  $x_0 = 3$

**a.**  $f(x_0) =$                       **b.**  $f'(x) =$                       **c.**  $f'(x_0) =$                       **d.**  $y =$

**2.**  $f(x) = \frac{4}{x-2}$  , avec  $I = ]-\infty ; 2[$  et  $x_0 = 0$

**a.**  $f(x_0) =$                       **b.**  $f'(x) =$                       **c.**  $f'(x_0) =$                       **d.**  $y =$

**3.**  $f(x) = 3x^3 - 6x^2 - 7x + 10$  , avec  $I = \mathbb{R}$  et  $x_0 = 2$

**a.**  $f(x_0) =$                       **b.**  $f'(x) =$                       **c.**  $f'(x_0) =$                       **d.**  $y =$

**4.**  $f(x) = \frac{2}{x-3}$  , avec  $I = ]3 ; +\infty[$  et  $x_0 = 4$

**a.**  $f(x_0) =$                       **b.**  $f'(x) =$                       **c.**  $f'(x_0) =$                       **d.**  $y =$

**5.**  $f(x) = (2x + 1)^2$  , avec  $I = \mathbb{R}$  et  $x_0 = 3$

**a.**  $f(x_0) =$                       **b.**  $f'(x) =$                       **c.**  $f'(x_0) =$                       **d.**  $y =$

**6.**  $f(x) = \frac{5x-2}{3x-4}$  , avec  $I = ]\frac{4}{3} ; +\infty[$  et  $x_0 = 2$

**a.**  $f(x_0) =$                       **b.**  $f'(x) =$                       **c.**  $f'(x_0) =$                       **d.**  $y =$

**7.**  $f(x) = \sqrt{x+4}$  , avec  $I = ]-4 ; +\infty[$  et  $x_0 = 0$

**a.**  $f(x_0) =$                       **b.**  $f'(x) =$                       **c.**  $f'(x_0) =$                       **d.**  $y =$

**8.**  $f(x) = \frac{1}{x^2 + 2x + 2}$  , avec  $I = \mathbb{R}$  et  $x_0 = 0$

**a.**  $f(x_0) =$                       **b.**  $f'(x) =$                       **c.**  $f'(x_0) =$                       **d.**  $y =$

**9.**  $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$  , avec  $I = \mathbb{R}$  et  $x_0 = 1$

**a.**  $f(x_0) =$                       **b.**  $f'(x) =$                       **c.**  $f'(x_0) =$                       **d.**  $y =$

**10.**  $f(x) = \sqrt{2x-1}$  , avec  $I = ]\frac{1}{2} ; +\infty[$  et  $x_0 = 5$

**a.**  $f(x_0) =$                       **b.**  $f'(x) =$                       **c.**  $f'(x_0) =$                       **d.**  $y =$